

## Faltenbehandlung mit Botox®

Für eine minimal-invasive Faltenbehandlung und die Behandlung medizinischer Erkrankungen wie Schielen, zervikale Dystonie, Blepharospasmus, erhöhte Steifigkeit der Muskulatur oder schwerer axillärer Hyperhidrose (übermäßiges Schwitzen der Achselhöhlen) wird Botulinum-Toxin A (Botox®) verwendet

### Wirkung von Botox®

Botox® blockiert überaktive Nervenimpulse und reduziert so Muskelkontraktionen. Nach 3 – 5 Tagen nach dem Einspritzen von Botox® entspannt sich die Muskulatur und nach 2 Wochen ist der Faltenrückgang festzustellen.

Die Wirkungsdauer beträgt in der Regel 4 – 6 Monate. Botox® kann horizontale Stirnfalten, Zornesfalten, Falten zwischen den Augenbrauen, Lachfalten, Nasenfältchen oder Lippenfältchen glätten.



# REBA

Plastische und Ästhetische Chirurgie

im GeorgsPalast Hannover

## Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

### Anwendungsgebiet

Faltenbehandlung, medizinische Erkrankungen (Schielen, zervikalen Dystonie, Blepharospasmus, erhöhte Steifigkeit der Muskulatur in Ellenbogen, Handgelenk und Fingermuskeln bei Erwachsenen mit Spastizität der oberen Extremitäten und Symptome schwerer primärer axillärer Hyperhidrose)

### Im Vorfeld

Gesichts- und Mimikanalyse

### Sichtbares Ergebnis

nach 3 - 5 Tagen, spätestens 2 Wochen

### Wirkungszeit

In der Regel 4 - 6 Monate

**Für weitere Fragen können Sie hier Kontakt aufnehmen**