

Faltenbehandlung mit dem Fadenlift

Die Faltenbehandlung mit Botox® und Hyaluronsäure kann nur bis zu einem bestimmten Ausprägungsgrad angewandt werden. Eine Faltenkorrektur mit PDO-Fäden oder Milchsäure-Fäden kann bei einem ausgeprägten Befund bei beginnender Hauterschaffung ohne großen Hautüberschuss realisiert werden.

Methode

Durch Milchsäure-Fäden kann eine sofortige anhebende Wirkung erzielt werden. Die Gewebe der betroffenen Bereiche werden mithilfe der resorbierbaren Kegel zusammengezogen und angehoben. Beide Fädensorten lösen sich innerhalb weniger Monate auf und regen dabei die Kollagenbildung an. So wird der Behandlungsbereich nochmals verbessert.

Ergebnis

Sofortige und diskrete Lifting-Wirkung mit regenerativer Wirkung für sanfte und natürliche Ergebnisse durch die Kollagenneogenese.

Die Wirkungsdauer beträgt 2 Jahre.



REBA

Plastische und Ästhetische Chirurgie

im GeorgsPalast Hannover

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

Anwendungsgebiet

Bei einem sehr ausgeprägten Faltenbefund

Genesung

Fäden lösen sich innerhalb weniger Monate von selbst auf
die Kollagenbildung wird angeregt

Sichtbares Ergebnis

Sofortige Wirkung

Wirkungsdauer

2 Jahre anhaltender Straffungseffekt

Für weitere Fragen können Sie hier Kontakt aufnehmen